

	リスク段階	項目 触診・視診・問診 (よく触って・よく診て・よく聴いて)	フットチェック間隔
 High	リスク 8	足潰瘍・切断既往がある	1回/月
	リスク 7	知覚神経障害あり 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできない	1回/月
	リスク 6	知覚神経障害なし 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできない	1回/月 (観察時にケア予定の 計画立案)
	リスク 5	知覚神経障害あり 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできる	1回/2ヶ月
	リスク 4	知覚神経障害なし 血流障害あり (ABI=0.6 ~ 0.8 or SPP40 未満) セルフケアできる	1回/3ヶ月
	リスク 3	知覚神経障害あり 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできない	1回/4ヶ月 (フットケア1.5ヶ月毎)
	リスク 2	知覚神経障害なし 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできない	1回/6ヶ月 (フットケア3ヶ月毎)
	リスク 1	知覚神経障害あり 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできる	1回/6ヶ月
Low	リスク 0	知覚神経障害なし 血流障害なし (ABI=0.9 ~ 1.3) セルフケアできる	1回/年

★ABI0.9 以下または 1.3 以上動脈触知不良でリスク 4 以上の場合は SPP 測定。

『SPP40 未満で下肢動脈血流エコー』

DM 性視力障害はセルフケアできないに分類。